

GUÍA PARA PADRES:

CÓMO LEER LOS NIVELES DE PLOMO

82 207.2

Pb

Lead

Para obtener más
información, visite:

[CDC Acciones
Recomendadas](#)

0-3.5 (µg/ml): Bajos riesgos para la salud

- Asegúrese de que se cumplan los hitos y los requisitos nutricionales apropiados para la edad durante las visitas de control del niño sano
- Pruebas de seguimiento de plomo durante los intervalos de edad recomendados para el niño

3.5-19 (µg/ml): posibles riesgos para la salud

- Siga las pautas anteriores para 0-3,5 (µg/ml).
- Comunique los resultados al departamento de salud local/estatal.
- Obtenga el historial de exposición ambiental y organice una investigación ambiental.
- Realice pruebas a los niños para detectar deficiencias de hierro/nutricionales y de desarrollo.
- Pruebas de seguimiento (1-3 meses).

20-44 (µg/ml): riesgos graves para la salud

- Siga las pautas anteriores para 3,5-19 (µg/ml)
- Realice una historia clínica completa y un examen físico.
- Organice una investigación ambiental y un programa de reducción del riesgo de exposición al plomo.
- Considere la posibilidad de realizar una radiografía abdominal al niño.
- Pruebas de seguimiento (2 semanas-1 mes)

>45 (µg/ml): implicaciones urgentes para la salud

- Siga las pautas anteriores para 20-44 (µg/ml)
- Examen neurológico detallado
- Ingreso hospitalario (si el niño presenta síntomas de intoxicación por plomo: convulsiones, debilidad, vómitos, etc.)
- Pruebas de seguimiento (lo antes posible)